

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE SALICREM? FÓRMULA: Cada 100 gramos contiene:

Principio activo: salicilato de dietilamina 10,0 g y benzocaína 5,0 g. Excipientes: vaselina líquida, cera autoemulsionable, propilenglicol, multilan A, miristrato de isopropilo, metilparabeno, propilparabeno, EDTA disódico, butilhidroxitolueno, metabisulfito de sodio, esencia de eucalipto, esencia de menta, agua desmineralizada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiinflamatorio, analgésico y antirreumático de uso externo.

¿PARA QUÉ SE USA SALICREM?

Alivio local del dolor y de la inflamación leves y ocasionales producidos por: afecciones reumáticas, articulares (lumbalgia, tortícolis), golpes, distensiones musculares y/o tendinosas, torceduras.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR SALICREM?

Las que tienen alergia a alguno de los componentes del producto. Las que tengan heridas, quemaduras solares. Las que tengan alergia al Ácido Acetilsalicílico u otros antiinflamatorios.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Utilizar solo en la piel intacta. Evitar el contacto con los ojos. No utilizar vendajes oclusivos. No utilizar en áreas extensas. Usar sólo en la zona afectada. No usar sobre mucosas. No aplicar simultáneamente con otros productos. No exponer al sol la zona afectada, durante el tratamiento ni por 2 semanas posteriores al mismo. No utilizar en menores de 12 años.

Si ud. está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Si los síntomas persisten por más de 48-72 horas consulte a su médico. "Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico".

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

En algunos casos pueden aparecer: enrojecimiento y ardor en la piel, picazón, erupciones, hinchazón. Si estos u otros síntomas aparece, suspenda la aplicación y consulte a su médico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

SOLAMENTE PARA USO EXTERNO. NO INGERIR.

Adultos y niños mayores de 12 años: aplicar 2 ó 3 veces al día una cantidad de 5 a 10 cm de crema sobre la zona afectada, friccionando suavemente hasta su absorción. Lavar las manos después de cada aplicación. No aplicar por más de 7 días seguidos. NO UTILIZAR EL PRODUCTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME APLIQUE MÁS DE LA CANTIDAD INDICADA? SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de intoxicación accidental, vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández: (011) 4801-5555 / 7767

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar por debajo de los 30°C.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N° : 22.011.

Fecha de la última revisión: 30/01/2015.

PRESENTACIONES: Pomos x 40g y 80g.