

Allerplus®

Cetirizina HCL

10 mg.

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

Conserve este prospecto, contiene información que puede serle útil volver a leer.

¿QUÉ CONTIENE ALLERPLUS? FÓRMULA: Cada comprimido recubierto contiene:

PRINCIPIO ACTIVO: cetirizina diclorhidrato 10 mg.

EXCIPIENTES: almidón de maíz 40 mg; estearato de magnesio 1,20 mg; lactosa 66,0 mg; povinilpirrolidona 2,80 mg; polietilenglicol 0,300 mg; hidroxipropilmetilcelulosa 2,40 mg; dióxido de titanio 0,120 mg;

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antialérgico.

¿PARA QUÉ SE USA ALLERPLUS?

Para el tratamiento sintomático de procesos alérgicos tales como rinitis alérgica estacional, y perenne y sus manifestaciones: secreción nasal, picazón de ojos, nariz y/o garganta, lagrimeo, estornudos, alergia de la piel, nariz roja.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ALLERPLUS??

Para los pacientes con insuficiencia renal moderada o severa, así como en los pacientes en hemodiálisis y enfermedad hepática es necesario el ajuste de la dosis.

NO UTILICE CETIRIZINA SI PADECE INSUFICIENCIA RENAL O HEPÁTICA SIN CONSULTAR A SU MÉDICO.

ESTE MEDICAMENTO NO PUEDE UTILIZARSE EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS SIN INDICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO PEDIATRA.

SI UD. ESTA TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, ESTÉ EMBARAZADA O LO SOSPECHA, O ESTÁ AMAMANTANDO, CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE MEDICAMENTO.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Se han reportado casos de somnolencia con el uso de la cetirizina, al igual que ocurre con otros antialérgicos.

Si presenta somnolencia se aconseja no manejar u operar con maquinarias que requieran estado de concentración y alerta.

Si la somnolencia ocurre, también puede intentarse la toma del comprimido por la noche, si se requiere alerta durante el día.

Al igual que todos los antihistamínicos, debiera evitarse el consumo excesivo de alcohol, sedantes y/o fármacos depresores del sistema nervioso central.

Cuando la cetirizina se ingiere de acuerdo a las dosis recomendadas, debido a su contenido de lactosa, se desaconseja su uso en personas con insuficiencia de lactasa, galactosemia o síndrome de mala absorción glucosa/galactosa.

No sobrepasar las dosis mencionadas.

Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden impedir o disminuir las reacciones que de otra manera serían positivas.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su doctor o a su farmacéutico, si usted advierte los siguientes síntomas: Cefalea, náuseas, faringitis, mareos o vértigo, somnolencia, fatiga, agitación o excitación, sequedad bucal, molestias abdominales o gástricas.

Si usted presenta cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspenda el uso del medicamento inmediatamente y consulte a su médico.

Si presentó una reacción alérgica a cualquiera de los ingredientes del producto o a cualquier otro antihistamínico, no tome la medicación.

SI LOS SÍNTOMAS ALÉRGICOS PERSISTEN, EMPEORAN O APARECEN SÍNTOMAS DIFERENTES DE LOS INICIALES, CONSULTE A SU MÉDICO.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?:

Una sola toma diaria produce alivio de los síntomas alérgicos las 24 horas.

Adultos y niños mayores de 12 años: un comprimido (10 mg) cada 24 horas.

Si usted se olvidó de tomar la medicación, puede tomarla tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar 24 horas antes de tomar el próximo comprimido.

La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos.

Si los síntomas alérgicos persisten o empeoran o se acompañan de otro/s síntoma/s nuevos, suspenda INMEDIATAMENTE el medicamento y consulte a su médico.

MODO DE ADMINISTRACIÓN:

El momento de la administración puede variar según las necesidades del paciente. Ingerir el comprimido con suficiente agua, sin ser masticado ni disuelto.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS DE LA CANTIDAD NECESARIA?

En caso de una sobredosis, o si tomó más cantidad de la necesaria, vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel: (011) 4962 - 6666 / 2247.

- Hospital Dr. Alejandro Posadas - Tel: (011) 4654 - 6648 / 4658 - 7777.

- Centro de asistencia toxicológica de La Plata - Tel: (0221) 451 - 5555.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA? Llame por teléfono a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi - Tel: 0800 - 444 - 2468.

ANMAT Responde - Tel: 0800 - 333 - 1234.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

MODO DE CONSERVACIÓN: Conservar entre 15°C y 25°C, la abrigo de la luz.

PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 10, 15, 20, 30 y 60 comprimidos recubiertos.

Dispenser conteniendo 500 y 1000 comprimidos recubiertos.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 22/01/2019.

ELABORADO EN: LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

TITULAR: Laboratorio E. J. Gezzi S.R.L.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD

Certificado número: 55.346.