

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

Conserve este prospecto, contiene información que puede serle útil volver a leer.

¿QUÉ CONTIENE ALLERPLUS? FÓRMULA: Cada ml de solución contiene: **FÓRMULA:** Principio activo: Cetirizina diclorhidrato 10 mg; **EXCIPIENTES:** Glicerina, propilenglicol, acetato de sodio, ácido acético, sacarina sódica, metilparabeno, propilparabeno, agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antialérgico.

¿PARA QUÉ SE USA ALLERPLUS?

En rinitis alérgica: para el alivio temporario de sus síntomas o manifestaciones: Secreción nasal, picazón de ojos, nariz y/o garganta, lagrimeo, nariz roja, estornudos.

En alergias de piel que se manifiesten con picazón y enrojecimiento de la misma.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ALLERPLUS?

NO USE este medicamento si usted es: •Alergico al principio activo (cetirizina) o a otro de los principios inactivos de la fórmula. •Alérgico a otros principios activos antialérgicos derivados de las piperazina, como la hidroxina u otros.

•No usar en menores de 6 años de edad. •Paralos pacientes con insuficiencia renal moderada o severa, así como en los pacientes en hemodiálisis y enfermedad hepática es necesario el ajuste de la dosis.

NO UTILICE CETIRIZINA SI PADECE INSUFICIENCIA RENAL O HEPÁTICA SIN CONSULTAR A SU MÉDICO.

Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de aplicar este producto. Entre cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con Allerplus, si usted:

•Sufre ataques agudos de asma. •Tiene intolerancia hereditaria a ciertos azúcares. •Tiene menos de 6 años de edad. •Tiene más de 65 años. •Sufre problemas de hígado o riñón. •Recibe algún otro medicamento. •No sobrepasar las dosis mencionadas. •Se han reportado casos de somnolencia con el uso de cetirizina, al igual que ocurre con otros antialérgicos. Si presenta somnolencia se aconseja no manejar u operar con maquinaria que requieran estado de concentración y alerta. Si la somnolencia ocurre, también puede intentarse la toma de Allerplus por la noche, si se requiere alerta durante el día. •Al igual que otros antihistamínicos, debiera evitarse el consumo excesivo de alcohol, sedantes y/o fármacos depresores del Sistema Nervioso Central. •Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier tipo de pruebas cutáneas, ya que los antialérgicos pueden impedir o disminuir las reacciones que de otra manera serían positivas.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su doctor o a su farmacéutico, si usted advierte los siguientes síntomas: Cefalea, náuseas, faringitis, mareos o vértigo, somnolencia, fatiga, agitación o excitación, sequedad bucal, molestias abdominales o gástricas.

Si usted presenta cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspenda el uso del medicamento inmediatamente y consulte a su médico.

SI LOS SÍNTOMAS ALÉRGICOS PERSISTEN, EMPEORAN O APARECEN SÍNTOMAS DIFERENTES DE LOS INICIALES, CONSULTE A SU MÉDICO.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Niños (partir de los 6 años de edad) menores de 30 Kg de peso: 10 gotas (5 mg) cada 24 horas.

Mayores de 30 Kg de peso: 20 gotas (10 mg) cada 24 horas o 10 gotas (5 mg) cada 12 horas.

Al presente no existen datos que sugieran la necesidad de reducir la dosis en ancianos.

La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos.

Si los síntomas alérgicos persisten o empeoran o se acompañan de otro/s síntomas/s nuevos, suspenda **INMEDIATAMENTE** el medicamento y consulte a su médico.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA? SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández - Tel. (011) 4801-555 / 7767

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: Conserve entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz.

ELABORADO EN: LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (1427) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N°: 55.346.

Fecha de la última revisión: 22/10/2019.

PRESENTACIONES: Envases conteniendo 20 ml de solución.