

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE SALICREM FORTE? FÓRMULA: Cada 100 gramos contiene:

Principio activo: Diclofenac dietilamina 1,160 gramos. Excipientes: EDTA disódico, carbopol 940, metilparabeno, propilparabeno, propilenglicol, alcohol etílico, trietanolamina 99%, agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Analgésico, antiinflamatorio.

¿PARA QUÉ SE USA SALICREM FORTE?

Alivio local del dolor y de la inflamación leves y ocasionales producidos por: afecciones reumáticas, articulares (lumbalgia, torticollis), golpes, distensiones musculares y/o tendinosas, torceduras.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR SALICREM FORTE?

Aquellas personas con alergia a alguno de los componentes del producto. No utilizar en caso de alergia al Ácido Acetilsalicílico u otros antiinflamatorios. Pacientes con antecedentes de asma. Menores de 15 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Utilizar sólo en piel intacta. No aplicar sobre heridas, mucosas ni quemaduras solares. Evitar el contacto con los ojos. No utilizar vendajes oclusivos. No utilizar en áreas extensas. Usar sólo en la zona afectada. No aplicar simultáneamente con otros productos. No exponer al sol la zona afectada durante el tratamiento, ni por 2 semanas posteriores al mismo. No utilizar en menores de 15 años.

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de aplicar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

En algunos casos pueden aparecer: enrojecimiento y ardor en la piel, picazón, erupciones, hinchazón. Si se presentara alguno de estos síntomas o dificultad para respirar, crisis de asma y/o reacciones alérgicas severas, suspenda la aplicación y consulte con su médico.

Si el dolor para el cual está utilizando este medicamento persiste por más de 7 días o empeora, suspenda la aplicación y consulte con su médico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Adultos y niños mayores de 15 años: aplicar 3 ó 4 veces al día una cantidad de 2-5 cm de gel sobre la zona afectada, friccionando suavemente hasta su absorción. Lavar las manos después de cada aplicación. No aplicar por más de 7 días seguidos. NO UTILIZAR EL PRODUCTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

NO UTILIZAR SI LA TAPA DEL POMO NO ESTA DEBIDAMENTE CERRADA.

Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48-72 horas, consulte con su médico.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME APLIQUE MÁS DE LA CANTIDAD INDICADA? SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de intoxicación accidental, vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández: (011) 4801-5555 / 7767

"Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico".

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar en su envase original a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N°: 50.714.

Fecha de la última revisión: 12/02/2015.

PRESENTACIONES: Pomo x 40 g y 100 g.