

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE APOFARM? FÓRMULA: Cada 100 gramos contiene:

PRINCIPIO ACTIVO: Aciclovir 5,0 g.

EXCIPIENTES: Propilenglicol, polisorbato 80, cera emulsionante, vaselina líquida, vaselina sólida, metilparabeno, propilparabeno, agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiviral, antiherpético.

¿PARA QUÉ SE USA APOFARM?

Está indicado para el alivio local de los síntomas ocasionados por los herpes simples labiales y faciales tales como picazón, ardor, etc.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR APOFARM?

- Aquellas personas con hipersensibilidad al aciclovir o a alguno de los componentes de la fórmula.
- Niños menores de 12 años de edad.
- Embarazo y lactancia.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

- Aplique la crema solo sobre los labios y la cara.
- No use la crema en el interior de la boca. Apofarm no debe ser usada para tratar las úlceras de la boca (aftas).
- No pinche las vesículas ni hurge o despegue la costra.
- Evite compartir elementos de higiene personal o para la alimentación.

Para evitar contagios:

- Lávese las manos después de aplicarse el producto.
- No poner en contacto la lesión del labio con otras zonas del cuerpo o con la piel de otras personas.
- No compartir toallas, servilletas ni pañuelos.

Este medicamento no previene brotes posteriores o reaparición de los síntomas.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Puede producir un leve enrojecimiento, picazón, sequedad o descamación de la piel en los sitios de aplicación.

También se han observado reacciones alérgicas (en labios, cara o párpados) y enrojecimiento cutáneo (rush).

Ante la aparición de cualquiera de estos signos suspenda el uso del medicamento y consulte a su médico.

Si el dolor o las lesiones persisten o se agravan consulte a su médico. Asimismo consulte con su médico si está en tratamiento por una afección que altere su sistema inmunológico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO? USO EXTERNO SOLAMENTE

Adultos y niños mayores de 12 años de edad: coloque la crema tan pronto reconozca la presencia de síntomas:

1- Lave sus manos antes y después de la aplicación de la crema.

2- Aplique la crema 5 veces al día cada 4 horas (omitendo la aplicación nocturna) hasta cubrir completamente el área afectada.

3- Use la crema por 5 días y de ser necesario, la aplicación puede continuar por 5 días más. Si al cabo de 10 días los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico. No exceda las dosis recomendadas.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME APLIQUÉ MÁS DE LA CANTIDAD INDICADA? SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de intoxicación accidental, vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández: (011) 4801-5555 / 7767

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar a una temperatura hasta 30°C. No refrigerar.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N° : 47.884.

Fecha de la última revisión: 06/09/2016.

PRESENTACIONES: Envases x 5 gramos.