

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE PULMOSAN ULTRA? FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:

Principio activo: clorhidrato de bromhexina 0,200 g. Excipientes: CMC sódica (cekol 4000), benzoato de sodio, propilenglicol, agua purificada, glicerina, esencia de cerezas, ciclamato de sodio, ácido tartárico, sorbitol 70%.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: mucolítico y expectorante (ayuda a disolver el moco para facilitar su eliminación).

¿PARA QUÉ SE USA PULMOSAN ULTRA?

Alivio de los síntomas del catarro bronquial y la tos, por fluidificación del moco, facilitando la expectoración.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR PULMOSAN ULTRA? NO USE este medicamento si usted sabe que:

- Es alérgico al principio activo o componentes de la fórmula.
- Tiene úlcera gastroduodenal.
- Tiene dificultad para expectorar, ya que durante el tratamiento es de esperar un aumento de la secreción..
- Tiene asma.
- Tiene enfermedades del hígado o riñón o toma alcohol.
- Menores de 12 años de edad.
- Pacientes en tratamiento con disulfiram.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE INGERIR EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Si está tomando simultáneamente algún medicamento, por ejemplo otros remedios para la tos.
- Si va a ser utilizado en personas mayores de 65 años.
- Dado que durante este tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, puede no ser aconsejable en pacientes con dificultades para expectorar.

Se han recibido informes de reacciones cutáneas intensas tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)/necrólisis epidérmica tóxica (NET) y pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA) asociadas a la administración de bromhexina. Si el paciente presenta síntomas o signos de exantema progresivo (en ocasiones asociado a ampollas o lesiones en las mucosas), deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento con bromhexina y consultar a su médico. Si usted recibe algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Interrumpa el uso y consulte a su médico si presenta:

Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Reacciones alérgicas severas con compromiso respiratorio, angioedema, dificultad para respirar, caída de la presión arterial y choque anafiláctico.

Reacciones alérgicas en la piel con picazón, edema cambio de color, urticaria, ampollas, pústulas, despegamiento de la piel.

¿CÓMO SE USA PULMOSAN ULTRA? Vía de administración: oral.

Los niños mayores de 12 años (más de 35 Kg de peso) y adultos pueden tomar 5 ml (una cucharadita tamaño té) tres veces por día o sea cada 8 horas. Dosis máxima: 15 ml por día.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Centros:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Centro de Asistencia de Toxicología La Plata: (0221) 451-5555

¿TIENE USTED ALGUNA CONSULTA ACERCA DE PULMOSAN FORTE? Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468. ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar en su envase original a temperatura ambiente (15°C - 25°C).

ELABORADO EN: LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (1427) - CABA.

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N °: 33.880.

Fecha de la última revisión: 21/05/2018.

PRESENTACIONES: Frascos x 120 ml de jarabe.

Si este medicamento le produjo algún EFECTO ADVERSO / NO DESEADO O NO CAUSÓ EFECTO, comuníquese con el ANMAT mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ON-LINE disponible en:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>