

Calmoflex®

Diclofenac Dietilamina

Gel

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

Conserve este prospecto, contiene información que puede serle útil volver a leer.

¿QUÉ CONTIENE CALMOFLEX GEL?

FÓRMULA: cada 100 gramos contiene: **PRINCIPIO ACTIVO:** Diclofenac dietilamina 1,16 gramos.

EXCIPIENTES: E.D.T.A. disódico, Carbopol 980, Metilparabeno, Propilparabeno, Propilenglicol, Alcohol etílico, Trietanolamina 99%, Agua purificada c.s.p. 100 gramos.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: analgésico y antiinflamatorio.

¿PARA QUÉ SE USA CALMOFLEX GEL?

Alivio local del dolor y de la inflamación leves y ocasionales producidos por: afecciones reumáticas, articulares (lumbalgia, tortícolis), golpes, distensiones musculares y/o tendinosas, torceduras.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR CALMOFLEX GEL?

Alergia a alguno de los componentes del producto.

No utilizar en caso de alergia al Ácido Acetilsalicílico u otros antiinflamatorios.

Pacientes con antecedentes de asma.

Menores de 15 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Utilizar sólo en la piel intacta.

No aplicar sobre heridas, mucosas ni quemaduras solares.

Evitar el contacto con los ojos.

No utilizar vendajes oclusivos.

No utilizar en áreas extensas.

Usar sólo en la zona afectada.

No aplicar simultáneamente con otros productos.

No exponer al sol la zona afectada, durante el tratamiento ni por 2 semanas posteriores al mismo.

No utilizar en menores de 15 años.

SI UD. ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, ESTÁ EMBARAZADA O DANDO DE MAMAR, CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE APLICAR ESTE MEDICAMENTO.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

En algunos casos pueden aparecer: enrojecimiento y ardor de la piel, picazón, erupciones e hinchazón. Si se presentara algunos de estos síntomas o dificultad para respirar, crisis de asma y/o reacciones alérgicas severas, suspenda la medicación y consulte con su médico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

DOSIS Y MODO DE USO:

Adultos y niños mayores de 15 años: Aplicar 3 ó 4 veces al día una cantidad de 2-5 cm de gel sobre la zona afectada, friccionando suavemente hasta su absorción. Lavar las manos después de cada aplicación.

No aplicar más de 7 días seguidos.

SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN O EMPEORAN POR MÁS DE 48-72 HS, CONSULTE A SU MÉDICO.

Ante la eventualidad de sobredosis o ingestión accidental concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

• Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247.

• Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel: (011) 4654-6648.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME APLIQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA INDICADA?

SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de intoxicación accidental, vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

• Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247.

• Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel: (011) 4654-6648.

• Hospital Fernández. Tel: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468.

ANMAT responde. TEL.: 0800-333-1234.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

ELABORADO EN:

LABORATORIOS EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 (C1427BSG) - C.A.B.A.

Director Técnico: Pablo M. Paramidani - Farmacéutico.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 52.218.

Fecha última revisión: 09/06/2025

Presentaciones:

Presentación pomo x 50g.

No utilizar el producto después de la fecha de vencimiento.

No usar si la tapa del pomo no está debidamente cerrada.