



ECONAZOL FUNGICIDA
NITRATO DE ECONAZOL 1%

Crema
Antimicótica

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE SINAMIDA ECONAZOL FUNGICIDA CREMA? FÓRMULA: Cada 100 gramos contiene:

Principio activo: Nitrato de econazol 1,00 gramo. Excipientes: cera emulsionante; alcohol cetílico; propilenglicol; ácido benzoico; butilhidroxianisol; agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico tópico.

¿PARA QUÉ SE USA SINAMIDA ECONAZOL FUNGICIDA CREMA?

Para el tratamiento de los hongos de los pies y entrepiernas.

Estas afecciones generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como: picazón, ardor, mal olor, despegamiento y sarpullido.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR SINAMIDA ECONAZOL FUNGICIDA CREMA?

Aquellas personas con hipersensibilidad al econazol tópico o a los demás componentes de la fórmula.

Menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No indique su empleo a otras personas ni lo utilice para otras afecciones de la piel. Sólo para uso externo.

No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos ni genitales. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho al bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

"Ante cualquier duda consulte con su médico y/ ó con su farmacéutico."

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Para complementar el tratamiento es recomendable que implemente las siguientes medidas: utilizar ropa holgada o de algodón, utilizar calzado bien ventilado.

Puede tener efectos adversos como: ardor, picazón, enrojecimiento u otros signos de irritación cutánea no presentes antes de usar este medicamento. Si esto ocurre, discontinue su uso.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Primero se debe limpiar la zona afectada y secar rápidamente. Luego aplicar una fina capa de SINAMIDA ECONAZOL FUNGICIDA sobre la zona afectada cada 12 horas.

En el pie de atleta preste especial atención a los espacios entre los dedos.

El pie de atleta y la micosis del cuerpo requerirá 1 semana de tratamiento y la micosis inguinal 2.

Si los síntomas persisten durante un tiempo mayor al indicado o empeoran consulte a su médico.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME APLIQUE MÁS DE LA CANTIDAD INDICADA? SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de intoxicación accidental, vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández: (011) 4801-5555 / 7767

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Manténgase a temperatura ambiente, en lugar seco y al abrigo de la luz.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (1427) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N ° : 45.784.

Fecha de la última revisión: 06/02/2015.

PRESENTACIONES: Pomos x 30 y 60 gramos.