

VENTA LIBRE**INDUSTRIA ARGENTINA****LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:**

- Este medicamento es de venta libre o sea puede adquirirse sin receta médica, sin embargo para obtener los mejores resultados debe utilizarse en forma adecuada.
 - Conserve este prospecto puede tener que consultarlo.
 - Si los síntomas empeoran o persisten por más de 5 días, consulte a su médico.
- Si usted observa que algún efecto no deseado que pudiera aparecer es grave u observa la aparición de un efecto no deseado no mencionado en este prospecto, suspenda la ingestión de este medicamento e informe a su médico o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE HERBATOL MIEL FORTE? FÓRMULA: Cada 100 mililitros de jarabe contiene:

PRINCIPIO ACTIVO: Extracto seco de hojas de hiedra desecadas (*Hedera Helix* L. *Araliaceae*) (4-8:1) 0.700 gramos.

EXCIPIENTES: Ácido cítrico anhidro, sorbato de potasio, carboximetilcelulosa sódica, sorbitol 70%, esencia de limón, esencia de miel, agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Acción mucolítica (ayuda a desintegrar el moco para facilitar su eliminación).

¿PARA QUÉ SE USA HERBATOL MIEL FORTE?

Medicamento herbario utilizado para el alivio sintomático de la tos en afecciones de las vías respiratorias inferiores y superiores. Facilita la expulsión de las flemas.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Siempre agitar bien el frasco antes de usar.

Vía de administración: Oral.

No usar si el envase esta abierto o dañado.

Las dosis serán medidas con el vasito adjunto.

No se indica en niños menores de 2 años.

Niños de 2 a 5 años (11-21 kilogramos de peso): 2,5 ml cada ocho horas (3 veces por día). Dosis máxima 7,5 ml por día.

Niños de 6 a 12 años (22-35 kilogramos de peso): 5ml cada ocho horas (3 veces por día). Dosis máxima 15 ml por día.

Mayores de 12 y adultos (35 kg o más): 5 a 7,5 ml cada ocho horas (3 veces por día). Dosis máxima 22,5 ml por día.

No debe ser administrado en menores de 2 años y/o en ancianos sin consultar a su médico.

Duración del tratamiento: Tome el jarabe hasta que cedan los síntomas. Si los síntomas empeoran o persisten por más de 5 días, consulte a su médico o farmacéutico.

Si olvidó tomar Herbatol Miel Forte: No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR HERBATOL MIEL FORTE?

Si es usted alérgico al extracto de hojas de *Hedera Helix* o a cualquiera de los componentes del mismo.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Advertencias y precauciones de uso: Los cuadros de tos persistentes o recurrente en niños de 2 a 4 años de edad requieren de un diagnóstico médico previo al tratamiento.

En caso de presentarse malestares persistentes, dificultad para respirar, fiebre, expectoración (flema color verde amarillento) o con sangre debe consultarse al médico inmediatamente.

Se recomienda precaución en personas con gastritis o úlcera gástrica.

No se recomienda el uso concomitante con otros jarabes para suprimir la tos tales como codeína o dextrometorfano sin previa consulta médica. Este jarabe contiene como excipiente sorbato de potasio y ácido cítrico.

El exceso de potasio puede producir molestias de estómago y diarrea. No deberá administrarse este jarabe en pacientes con insuficiencia renal que estén tomando compuestos con aluminio para controlar la absorción de fosfatos ya que potencia la absorción intestinal del aluminio.

Este medicamento contiene sorbitol. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento.

Este medicamento contiene como principio activo un extracto vegetal y, por ende, su color puede variar ocasionalmente.

IMPORTANTE PARA LA MUJER: Se recomienda no utilizar este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Si los síntomas persisten por más de 5 días consulte con su médico.

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Conducción y uso de máquinas: Este medicamento no produce sueño.

Posibles efectos no deseados: Al igual que todos los medicamentos, se pueden producir efectos no deseados, aunque no todas las personas los sufran.

Puede producir náuseas, vómitos y reacciones de hipersensibilidad como pueden ser reacciones en la piel, picazón y sensación de falta de aire.

Este jarabe, ocasionalmente, puede tener efecto laxante.

Si se observa cualquier efecto no deseado o no descrito en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

USO DE OTROS MEDICAMENTOS. Interacciones: No se conocen hasta la fecha.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA? SOBREDOSIFICACIÓN:

La sobredosis de este producto puede provocar náuseas, vómitos, diarrea y agitación.

En caso de una sobredosis, o si tomó más cantidad de la necesaria, vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández: (011) 4801-5555 / 7767

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco a una temperatura entre 15°C y 30°C.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N° : 54.876.

Fecha de la última revisión: 05/05/2017.

PRESENTACIONES: Envases conteniendo 120 ml, con vasito dosificador.