

TERMOKIDS IBUPROFENO 2%

Suspensión oral – Uso pediátrico

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE TERMOKIDS? FÓRMULA: Cada 100 mililitros contiene:

Ibuprofeno 2,00 g; benzoato de sodio 0,1 g; sorbitol 70% 17,5 g; glicerina 12,5 g; ácido cítrico 0,6 g; goma xántica 0,4 g; tween 80 0,5 g; sacarina sódica 0,05 g; esencia de cereza 0,05 g; hidróxido de sodio (sol. al 10% c.s.p. pH (3,6 - 4,6)); agua purificada c.s.p. 100 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Analgésico, Antifebril, Antiinflamatorio.

¿PARA QUÉ SE USA TERMOKIDS?

Está indicado para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

AGÍTESE ANTES DE USAR. Deberá usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si ud. tiene una infección, consulte a su médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad. En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

TABLA DE DOSIFICACIÓN

PESO (Kg)	EDAD (años)	DOSIS (ml)
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	5 ml
16 a 21	4 a 5	7,5 ml
21 a 27	6 a 8	10 ml
27 a 32	9 a 10	12,5 ml
Más de 32	Más de 10	15 ml

En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN TOMAR TERMOKIDS?

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauciones: Consulte a su médico en estos casos:

-Si ud. tiene una infección, Termokids puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor.

Por lo tanto es posible que Termokids pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si ud. toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte al médico sin demora.

-El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento o el dolor y/o la fiebre empeoran.

-Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.

-En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.

-El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción náuseas y/o vómitos. Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.

-Aparecen síntomas nuevos.

-Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos. En esta eventualidad consulte a su médico. Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Advertencias: Salvo indicación médica: No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antitérmicos. No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.

No utilizar para el dolor de estómago.

Reacciones adversas: En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina) vértigos y cefalea.

Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA? SOBREDOSIFICACIÓN: Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas. Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777

-Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel: (0221) 451-5555.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Debe guardarse en su estuche original entre 15 y 30°C.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N°: 55.200.

Fecha de la última revisión: 02/08/2021.

PRESENTACIONES: Envases conteniendo 1 frasco de Suspensión Oral por 90 ml.