



CLORHIDRATO
DE TERBINAFINA

Crema
Antimicótica

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE SINAMIDA TERBINAFINA CREMA? FÓRMULA: Cada 100g contiene:

Principio activo: clorhidrato de terbinafina 1,0g. Excipientes: ceral PW, alcohol bencílico, alcohol cetosteárilico, tween 80, miristato de isopropilo, monoestearato de sorbitan, alcohol etílico hidróxido de sodio, agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico tópico.

¿PARA QUÉ SE USA SINAMIDA TERBINAFINA CREMA?

Para el tratamiento tópico de micosis superficiales tales como pie de atleta (tinea pedis) y para otras micosis de la piel ubicadas en ingle (tinea crural), manos, tórax y axilas.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR SINAMIDA TERBINAFINA CREMA?

Hipersensibilidad conocida a la terbinafina o a cualquiera de los excipientes. Menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este producto es de uso externo.

No utilizar en cuero cabelludo, uñas, ojos y zona genital. El uso irregular o la interrupción del tratamiento pueden ocasionar riesgo de recurrencia.

Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de aplicar este producto. Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Puede tener efectos adversos como: en general son poco frecuentes y debido a la hipersensibilidad (ardor, picazón, enrojecimiento y otros signos de irritación que no estaban presentes antes de la terapia).

Si existiera irritación cutánea o alergia, suspender el tratamiento y realizar consulta médica.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Usar en Adultos y niños mayores de 12 años. Antes de aplicar lavar el área afectada con agua y jabón y secar cuidadosamente. Aplicar cada 12 ó 24 hs en la zona afectada y a la zona circundante. Para el "pie de atleta" (micosis de los pies), aplicar con especial atención en los espacios entre los dedos, cada 12 hs. Se recomienda cambiar las medias diariamente y antes de colocarse el calzado asegurarse que el interior esté seco.

Lavarse las manos después de cada uso. La duración del tratamiento, siempre y cuando su uso sea regular e ininterrumpido, es de 7 días.

No utilizar el producto después de la fecha de vencimiento.

Si los síntomas persisten o empeoran luego de una semana de tratamiento, consulte a su médico.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME APLIQUE MÁS DE LA CANTIDAD INDICADA? SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de intoxicación accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández: (011) 4801-555 / 7767

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura ambiente inferior a 25°C.

ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (1427) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N ° : 54.309.

Fecha de la última revisión: 05/03/2015.

PRESENTACIONES: Envases por 15g y 30g.