

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE INMUNOGRIPLUS? FÓRMULA: Cada comprimido recubierto contiene:

PRINCIPIO ACTIVO: paracetamol 500,0 mg, butetamato citrato 40,0 mg, cafeína 30,0 mg, fenilefrina clorhidrato 8,0 mg.

EXCIPIENTES: almidón de maíz, aerosil, estearato de magnesio, lactosa povidona, croscarmelosa sódica, opadry.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Descongestivo, calma el dolor, baja la fiebre, calma la tos.

¿PARA QUÉ SE USA INMUNOGRIPLUS?

Inmunogrip Plus está indicado para el alivio sintomático de los procesos que cursan con fiebre, dolor y congestión mucosa de las vías aéreas (nasal, faríngea y bronquial), para el alivio de estados gripales y/o resfriados, para reducir la fiebre.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR INMUNOGRIPLUS?

No use este medicamento: • Si ud. sabe que es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula. • Niños menores de 16 años. • Si a ud. la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios le provocan asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. • Si ud. padece de úlcera péptica activa o antecedentes de úlcera recurrente. • En caso de enfermedad de la glándula tiroides, enfermedad hepática, hepatitis, trastornos renales o alcoholismo. • Si ud. padece glaucoma (aumento de la presión intraocular). • Si padece de agrandamiento de la próstata con dificultad para orinar. • Si padece alguna enfermedad del corazón (taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho, presión alta no controlada). • Si ud. está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

• Emplear con precaución si ud. padece de afecciones del corazón, diabetes, enfermedades de próstata o presión arterial alta. • Si está tomando algún otro medicamento, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. • Si consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte con su médico antes de tomar este medicamento. • Consulte con su médico si ud. está tomando al mismo tiempo: -Anticonvulsivantes (medicación para la epilepsia). -Anticonceptivos orales. -Antibióticos. -Diuréticos. -Antiespasmódicos (medicación para los dolores tipo cólicos o retortijones). -Antinauseas (medicación para vómitos). -Anticoagulantes. -Antidepresivos.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

• Evite el consumo de bebidas alcohólicas. Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como vómitos, malestar gástrico, náuseas, sudoración, dificultad para respirar, aumento de la presión arterial, insomnio, excitación, nerviosismo, reacciones en la piel tales como urticaria, enrojecimiento, prurito. Si algo de esto ocurre o aparece algún otro síntoma no descripto anteriormente, suspenda la medicación y consulte con su médico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración: oral. Adultos y niños mayores de 16 años de edad: 1 comprimido recubierto cada 8 horas. Dosis máxima 3 comprimidos por día. Si los síntomas de dolor o fiebre persisten por más de 48-72 horas consulte con su médico.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA? SOBREDOSIFICACIÓN:

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández: (011) 4801-5555 / 7767

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura ambiente (15°C - 25°C).

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N° : 50.003.

Fecha de la última revisión: 25/04/2017.

PRESENTACIONES: Envases por 10 comprimidos recubiertos.