

**POMADA**  
**MANZAN**<sup>®</sup>  
**ANTIHEMORROIDAL**

FENOL - ALCANFOR - TIMOL - EXTRACTO DE HAMAMELIS VIRGINIANA - ESENCIA DE EUCALIPTO

**VENTA LIBRE**

**INDUSTRIA ARGENTINA**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:**

**¿QUÉ CONTIENE MANZAN? FÓRMULA:** Cada 100 gramos contiene:

**PRINCIPIO ACTIVO:** fenol 1,641 g; alcanfor 0,066 g; timol 0,008 g; extracto de hamamelis virginiana 2,134 g; esencia de eucalipto 0,295 g. **EXCIPIENTES:** lanolina, esterlan SN y vaselina blanca.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Alivio de inflamación, ardor, dolor y picazón de las hemorroides.

**¿PARA QUÉ SE USA MANZAN?**

Está indicado para el alivio sintomático de los procesos hemorroidales en sus estadíos iniciales.

**¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR MANZAN?**

Alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula. Menores de 18 años.

**¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** No aplicar más cantidad de lo necesario para cubrir la zona afectada.

No aplicar sobre los ojos, mucosas o superficies lastimadas (úlceras, heridas).

En caso de hemorroides sangrantes consulte a su médico antes de utilizar el producto. Si ud. está embarazada o dando de amamantar, consulte a su médico antes de usar este producto.

*Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.*

**¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?**

**REACCIONES ADVERSAS:** En caso de aparecer irritación local deberá interrumpirse el uso de la pomada.

**SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN POR MÁS DE 7 DÍAS O EMPEORAN CONSULTE CON SU MÉDICO.**

**¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

Dosis y modo de uso: Empléese por la mañana, por la noche y de ser posible después de cada evacuación. Entre una y otra aplicación se debe dejar un espacio de 3 ó 4 horas. No debe usarse más de 4 veces al día. Limpiar y secar con cuidado el área inflamada. Frotar suavemente con el dedo. Para el uso intrarectal, introducir suavemente la cánula en el recto y aplicar una cantidad equivalente al contenido aproximado de una cucharadita de té. La inserción es favorecida si se unta previamente la cánula con un poco de pomada. Es muy importante la estricta higiene. Lave sus manos cuidadosamente antes y después de cada aplicación. Mantenga el tubo de la pomada, la tapa y la cánula escrupulosamente limpios. La cánula se debe lavar con agua y jabón.

*Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.*

*Ante cualquier duda consulte a su médico.*

**¿QUÉ DEBO HACER SI ME APLIQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA INDICADA? SOBREDOSIFICACIÓN:**

En caso de intoxicación accidental, vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas. Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández. Tel: (011) 4801-5555 / 7767

**¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

Llame sin cargo a:

**Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468**

**ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234**

**FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:**

Conservar por debajo de 25°C.

**ELABORADO EN:**

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

**DIRECTOR TÉCNICO:** Pablo Paramidani – Farmacéutico.

**ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.**

**CERTIFICADO N°: 266.**

Fecha de la última revisión: 12/02/2015.

**PRESENTACIÓN:** Pomo x 34g