

Vixorfit®

GLICERINA 1% - SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL
VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE VIXORFIT? FÓRMULA: Cada 100 mililitros contiene:

PRINCIPIO ACTIVO: glicerina 1,00 gramo.

EXCIPIENTES: cloruro de sodio, cloruro de potasio, ácido bórico, borato de sodio, edetato disódico, cloruro de benzalconio, agua estéril para inyectables.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Lubricante ocular.

¿PARA QUÉ SE USA VIXORFIT?

Para aliviar temporalmente y/o prevenir irritaciones menores del ojo y síntomas asociados tales como ardor, enrojecimiento ocular y sequedad.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Colocar 1 ó 2 gotas en cada ojo de acuerdo a la intensidad de la sintomatología.

Ante cualquier duda consultar con su médico.

Notas importantes:

-Si usa lentes de contacto deberá quitárselos antes de aplicar este producto.

-Para evitar contaminación evite que la punta del envase entre en contacto con superficie alguna.

-Inmediatamente después de cada uso, siempre vuelva a colocarle la tapa al envase.

Conservar el envase perfectamente cerrado mientras no lo usa.

No utilizar este producto si carece del precinto de seguridad que recubre el cuello del envase, o si el mismo está dañado.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR VIXORFIT?

Contraindicaciones: Alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

¿QUÉ CUIDADOS SE DEBE TENER MIENTRAS SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Si los síntomas (irritaciones menores del ojo y síntomas asociados tales como ardor, enrojecimiento ocular, sequedad) malestar o dolencia persisten por más de 72 hs o empeoran consulte a su médico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauciones y advertencias:

-Si usa lentes de contacto deberá quitárselos antes de aplicar este producto.

-Si la solución cambia de color o presenta turbidez no la utilice.

-Si experimenta dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento o irritación ocular interrumpida o cualquier otro síntoma no habitual, deberá interrumpir el tratamiento y consultar de inmediato con su médico.

-Para evitar contaminación evite que la punta del envase entre en contacto con superficie alguna.

-Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de aplicar este medicamento.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI ME APLIQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas. Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Este medicamento no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Conservar a temperatura inferior a 30°C. Una vez abierto, utilizar durante 30 días como máximo.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N°: 48.418.

Fecha de la última revisión: 22/04/2015.

PRESENTACIONES: Envase conteniendo 1 frasco con pico-gotero, con 15 ml de solución.