Bromhexina®

Clorhidrato de Bromhexina
80 mg/100 ml.

VENTA LIBRE **INDUSTRIA ARGENTINA**

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE BROMHEXINA GEZZI? FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
PRINCIPIO ACTIVO: clorhidrato de bromhexina 0,08 gramos.
EXCIPIENTES: ácido tartárico, ácido benzóico, carboximetilcelulosa sódica, esencia de cerezas, glicerina, sorbitol 70%, alcohol etílico y agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Mucolítico y expectorante (ayuda a disolver el moco para facilitar su eliminación).

¿PARA QUÉ SE USA BROMHEXINA GEZZI?
Alivio de los síntomas del catarro bronquial y la tos, por fluidificación del moco, facilitando la expectoración.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR BROMHEXINA GEZZI?
No use este medicamento si usted sabe que:
• Es alérgico al principio activo o componentes de la fórmula. • Tiene úlcera duodenal. • Tiene dificultad para expectorar. • Tiene asma. • Tiene enfermedades del hígado o riñón o toma alcohol. • Menores de 6 años. • Pacientes en tratamiento con Disulfiram.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Consulte con su médico antes de ingerir este medicamento en los siguientes casos:
• Si está tomando simultáneamente algún medicamento, por ejemplo otros medicamentos para la tos.
• Si va a ser utilizado en personas mayores de 65 años.
• Dado que durante este tratamiendo es de esperar un aumento de la secresión, puede no ser aconsejable en pacientes con dificultades para expectorar.
Se han recibido informes de reacciones cutáneas intensas tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)/necrólisis epidérmica tóxica (NET) y pustulosis exantematosa generalizada aguda (PEGA) asociadas a la administración de Bromhexina. Si el paciente presenta síntomas o signos de exantema progresivo (en ocasiones asociado a ampollas o lesiones en las mucosas), deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento con Bromhexina y deberá consultar con su médico.
Si usted recibe algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento, como gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal), respiratorios (reacciones alérgicas severas, dificultad para respirar, etc) y de la piel (picazón, ronchas).
Trastornos del sistema inmunológico (raras: reacciones de hipersesinbilidad, frecuencia no conocida: reacciones anafilácticas tales como choque anafiláctico, angioedema y prurito), transtornos de la piel y del tejido subcutáneo (raras: exantema, urticaria; frecuencia no conocida: reacciones cutáneas intensas tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantematosa generalizada aguda), si ésto sucede, suspender el tratamiento y consultar al médico.
Si los síntomas del catarro bronquial persisten por más de 2 días o empeoran, consulte inmediatamente con su médico.
No administrar este producto por más de 5 días.

¿CÓMO SE USA BROMHEXINA GEZZI?
Los niños mayores de 12 años (más de 35 kilogramos de peso) y adultos pueden tomar 10 mililitros (una cucharada tamaño sopa) 3 veces por día o sea cada 8 horas.
Para niños de 6 a 12 años (hasta 35 kilogramos de peso) la dosis es de 5 mililitros (1 cucharadita tamaño café) 3 veces por día (cad a8 horas). Para niños menores de 6 años, consulte a su médico.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS DE LA CANTIDAD NECESARIA? SOBREDOSIFICACIÓN:
Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:
-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777
-Centro de Asistencia Toxicológica de La Placa: (0221) 451-5555

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

¿TIENE USTED ALGUNA CONSULTA ACERCA DE BROMHEXINA GEZZI?
Llame por teléfono a:
Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468
ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
En su envase original a temperatura ambiente (15°C - 30°C).

TITULAR: Laboratorios E. J. Gezzi S.R.L.

ELABORADO EN:
LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI
Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
CERTIFICADO N ° : 56.219.

Fecha de la última revisión: 26/01/2017.

PRESENTACIONES: envases por 120 ml de jarabe.

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adcersas a través del sistema nacional de farmacovigilancia al siguiente link: http://sistema.anmat_gov.ar/aplicaciones_net/applications/fvg_eventos_adversos_nuevo/index.html

7001-PG-260126

GEZZI