

VENTA LIBRE**INDUSTRIA ARGENTINA****LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO:**

¿QUÉ CONTIENE LORATADINA GEZZI? FÓRMULA: Cada 100 mililitros contiene: FÓRMULA: Principio activo: Loratadina 100 mg; EXCIPIENTES: Propilenglicol, glicerina, ácido cítrico anhidro, benzoato de sodio, azúcar granular, sabor ananá, metilparabeno, agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antialérgico (Antihistamínico).

¿PARA QUÉ SE USA LORATADINA GEZZI?

Se utiliza para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser: secreción nasal, estornudos, lagrimeo, picazón en los ojos, nariz y/o garganta. También se utiliza para alergias en la piel (ronchas o urticaria acompañadas o no de picazón).

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LORATADINA GEZZI?

NO USE este medicamento en los siguientes casos: •Alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula. •Niños menores de 6 años de edad. •Pacientes con enfermedad hepática y/o renal. •Pacientes con crisis asmática.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

•Tiene intolerancia a ciertos azúcares. •Tiene menos de 6 años de edad. •Tiene más de 65 años de edad. •Sufre problemas de hígado y/o riñón. •Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden interferir eventualmente dando falsos negativos.

Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de aplicar este producto. Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Puede producir cansancio, sedación, somnolencia, dolor de cabeza, mareos, náuseas, palpitaciones.

En pacientes pediátricos puede producir nerviosismo.

Si usted toma al mismo tiempo algún medicamento sedante o alcohol, puede incrementarse el riesgo de somnolencia y disminuir el estado de alerta. Evite el uso de cualquiera de los anteriores, junto a este medicamento.

Conducción y uso de máquinas: la medicación puede producir disminución de la capacidad de reacción o somnolencia a las dosis recomendadas. Si esto ocurre, absténganse de conducir y manejar maquinaria peligrosa.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Niños mayores de 6 años y con un peso menor a 30 kg: 5 ml de jarabe (1 cucharadita de té) cada 24 horas. Niños

mayores de 6 años y con un peso mayor a 30 kg: 10 ml de jarabe (2 cucharaditas de té) cada 24 horas.

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA? SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777

-Hospital de Niños Pedro Elizalde - Tel. (011) 4300-2115

-Centro Nacional de Intoxicaciones - Tel. 0800-333-0160

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICA.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

En un lugar fresco y seco entre 15°C y 30°C.

Evite el calor, la luz solar directa y humedad excesivos.

No refrigere este producto (no ponga este producto en la helader).

Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar éste o cualquier medicamento.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (1427) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N°: 52.685.

Fecha de la última revisión: 11/09/2015.

PRESENTACIONES: Envases conteniendo 60 mililitros.