

Loratadina Gezzi®

Loratadina 10 mg
Comprimidos

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE LORATADINA GEZZI?

Cada comprimido contiene: Loratadina 10,00 miligramos (almidón glicolato sódico, lactosa, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, estrato de magnesio).

ACCIÓN: Antialérgico (Antihistamínico).

¿PARA QUÉ SE USA LORATADINA GEZZI?

Se utiliza para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser: secreción nasal, estornudos, lagrimeo, picazón en los ojos, nariz y/o garganta.

También se utiliza para alergias de la piel (ronchas o urticaria acompañada o no de picazón).

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LORATADINA GEZZI?

No use este medicamento en los siguientes casos:

• Alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula. • Niños menores de 12 años de edad. • Pacientes con enfermedad hepática y/o renal. • Paciente con crisis asmática.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- Tiene intolerancia a ciertos azúcares.
- Tiene menos de 12 años de edad.
- Tiene más de 65 años.
- Sufre problemas de hígado y/o riñón.
- Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden interferir eventualmente dando falsos negativos.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Puede producir cansancio, sedación, somnolencia, dolor de cabeza, mareos, náuseas, palpitaciones.

En pacientes pediátricos puede producir nerviosismo. Si usted toma al mismo tiempo algún medicamento sedante o alcohol, puede incrementarse el riesgo de somnolencia y disminuir el estado de alerta. Evite el uso de cualquiera de los anteriores junto a este medicamento.

Conducción y uso de máquinas: la medicación puede producir disminución de la capacidad de reacción o somnolencia a las dosis recomendadas. Si esto ocurre, absténgase de conducir y/o manejar maquinaria peligrosa.

¿CÓMO SE TOMA LORATADINA GEZZI?

Adultos y mayores de 12 años: 1 comprimido (10 mg de Loratadina) por día. La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS DE LA CANTIDAD NECESARIA?

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777
- Hospital de Niños Pedro Elizalda. Tel: (011) 4300-2115
- Centro Nacional de Intoxicaciones. Tel: 0800-333-0160

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

¿TIENE USTED ALGUNA CONSULTA ACERCA DE LORATADINA GEZZI?

Llame sin cargo a: **Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468**

ANMAT responde, TEL.: 0800-333-1234

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

En lugar fresco y seco, en su envase original, entre 15 y 30°C.

TITULAR: Laboratorios E. J. Gezzi S.R.L.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI
Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N°: 52.685.

Fecha de la última revisión del prospecto autorizado: 11/09/2015.

PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 10 comprimidos. Proteja el producto de la luz solar directa y del calor excesivo. No refrigere este producto (no ponga este producto en heladera).

Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o cualquier medicamento.